


MALEZAS

Arroz

Daños que ocasionan



Macollamiento

Disminuye el número de macollos



Plagas

Favorecen su sobrevivencia afectando el normal desarrollo del cultivo



Costos

Se incrementan debido a los controles fitosanitarios y uso de herbicidas



Grano

Afecta al número de granos por panícula y reduce su peso



Rendimiento

Causan pérdidas

Control de malezas

Pre-emergente



Calibrar

El equipo de fumigación para determinar la cantidad de agua necesaria por hectárea y hacer uso eficiente del herbicida



Aplicar

Hasta 8 días después del trasplante, **2.5 litros** de **Pendimetalin** en mezcla con **2.5 litros** de **Bentiocarb** por hectárea


Post-emergente

En caso de presentarse malezas que escaparon al control pre emergente



Aplicar

20 días después del primer control de malezas, **400 gr** de Pyrazosulfurón ethyl con **200 ml** de adyuvante por hectárea



Si existe paja

Luego de una semana aplicar Cihalofop butil **1.3 litros** por hectárea

Labores como:




Recuerde



Uso de semilla de calidad



Siembra por trasplante con adecuada densidad



Uso de lámina de riego



Rotación de cultivos

Ayudan a controlar las malezas y reducir el uso de herbicidas