

MALEZAS

MAÍZ

Tipos de malezas

				
Caminadora <i>(Rottboellia exaltata)</i>	Lechoza <i>(Euphorbi sp.)</i>	Betilla <i>(Ipomoea spp.)</i>	Piñita <i>(Murdania nudiflora)</i>	Coquito <i>(Cyperus rotundus)</i>

Control manual

	Utilizar Machete o motoguadaña		Primera deshierba 15 días después de la siembra		Segunda deshierba 25 días después de la siembra, antes de fertilizar
---	--	---	---	--	--



Recuerde

En caso de existir abundante crecimiento de maleza realizar una chapía ligera a los tres meses después de la siembra



Control químico

	Utilizar productos químicos llamados "herbicidas o matamalezas"	Aplicarlos en:
		
	Pre-siembra (Antes de la siembra del cultivo)	Pre-emergencia (Luego de la siembra antes que emerja el cultivo y la maleza)
		Pos-emergencia (Cuando el cultivo y la maleza han emergido)

Pre-emergencia (Antes de la siembra)

Recomendaciones
(Utilizar **una** de las siguientes opciones)

	Glifosato en dosis de 1,5 a 2 litros/ha
	Atrazina en dosis de 1 litro/ha
	Pendimetalim en dosis de 3 litros/ha (para caminadora)



Pos-emergente (Después de la siembra)

Recomendaciones
(35 a 45 días después de la siembra utilizar **una** de las siguientes opciones)

	2,4 D en dosis de 1 litro/ha
	Nicosulfuron en dosis de 0,50 a 0,75 litros/ha



Recuerde




Eliminar
Residuos del cultivo anterior



Preparar
Adecuadamente el suelo